

La salud de su bebé está
en sus manos

Recuerde:

- La prueba rápida voluntaria es una opción efectiva y confiable para detectar el VIH y la sífilis.
- Solo necesita autorizarla mediante una carta de consentimiento informado que le proporcionará el personal de salud.
- El resultado es confidencial e inmediato, tarda 10 minutos; si es necesario, debe confirmarse con otra prueba de sangre.
- Existen medicamentos que debe tomar durante el embarazo para que su bebé pueda nacer libre de estas enfermedades.
- Una mujer que vive con VIH debe alimentar a su bebé solo con leche de fórmula, que el IMSS le dará durante el primer año de vida. Para alimentarlo recuerde usar vaso y/o cuchara.

Solicite información sobre la prueba
rápida voluntaria de VIH y sífilis.
¡Proteja su salud y la de su bebé!



DETECCIÓN DE VIH Y SÍFILIS DURANTE EL EMBARAZO



GOBIERNO DE
MÉXICO



¿Qué es el VIH?

- Es una infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) que afecta las defensas de las personas que la padecen.
- Una persona con VIH puede estar sin síntomas hasta por 10 años.
- La mujer embarazada con VIH sin tratamiento tiene hasta 25% de riesgo de transmitir la infección a su bebé durante el embarazo y parto vaginal, y 20% si lo alimenta con su leche materna.

¿Qué es la sífilis?

- Es una enfermedad de transmisión sexual que puede causar complicaciones a largo plazo si no se trata a tiempo y de manera adecuada.
- La mujer embarazada con sífilis puede transmitir la infección a su bebé durante la gestación, causando un parto prematuro y bajo peso al nacer.

¿Cómo se puede proteger al bebé de VIH y sífilis durante el embarazo y el nacimiento?

Para VIH:

- Tomando el tratamiento indicado.
- Programando el nacimiento del bebé, vía operación cesárea.
- Alimentándolo solo con leche de fórmula.
- Acudiendo a todas sus consultas durante el embarazo.

Para sífilis:

- Tomando el tratamiento indicado y completo.
- Acudiendo a todas sus consultas durante el embarazo.

¿Qué es la prueba rápida voluntaria (PRV) de detección de VIH y sífilis?

- La PRV es una oportunidad para detectar infecciones como el VIH y sífilis, y se actúe a tiempo para disminuir el riesgo de que su bebé adquiera la infección.

- Se realiza en los Módulos, con una gota de sangre obtenida de su dedo.
- La PRV es efectiva y segura.
- El resultado se obtiene en solo 10 minutos.
- Es gratuita y confidencial. Únicamente a usted le entregarán el resultado.
- Solicítela. Debe realizarla por lo menos tres veces durante su embarazo.

Lea el consentimiento informado que le entregará el personal de salud. Pregunte todas sus dudas antes de firmarlo.

¿Qué pasa si esta prueba es reactiva al VIH o a la sífilis?

La persona que le realizó la prueba la acompañará con su médico para que solicite otros estudios, con el fin de descartar o confirmar la infección.

¿Qué se debe hacer si se confirma la infección de VIH o sífilis?

En caso del VIH, su médico la enviará con el especialista en el manejo de este virus, ya que existen medicamentos que puede tomar de forma segura durante el embarazo.

En caso de la sífilis, el personal médico le otorgará el tratamiento adecuado.

En ambos casos, el equipo de salud le brindará manejo integral para prevenir que su bebé nazca con alguna de estas enfermedades.



Usted puede solicitar la prueba rápida voluntaria (PRV) de VIH y sífilis. ¡Es su derecho!

Deberá realizarla por lo menos tres veces durante el embarazo.